

COMRADE™

Fungicida per il controllo di ruggini (*Puccinia recondita*, *Puccinia striiformis tritici*) e septoria (*Mycosphaerella graminicola*) su cereali e Cercospora (*Cercospora beticola*) ed oidio (*Erysiphe betae*) su barbabietola da zucchero. Tipo di formulazione: sospensione concentrata

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 11 + 3 (FRAC)

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Azoxystrobin 18.22g (=200 g/l)

Ciproconazolo 7.29g (=80 g/l)

Coformulanti: quanto basta a g. 100



AVVERTENZA: PERICOLO

Indicazioni di Pericolo:

H302 Nocivo se ingerito

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

H351 Sospettato di provocare il cancro

H361 Può nuocere al feto

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza- Prevenzione:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso

P270 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'uso

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso

Consigli di prudenza- Reazione:

P301 + P312 **In caso di ingestione** accompagnata da malessere: contattare un **Centro Antivelieni** o un medico

P308 + P313 **In caso di esposizione** o possibile esposizione, consultare un medico

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito

Consigli di prudenza- Smaltimento:

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Titolare della registrazione: Sharda Europe b.v.b.a. Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium - Tel. +39 349 4118246

Autorizzazione Ministero della Salute n° 15989 del 01/09/2015

Stabilimenti di produzione: Chemia SPA, S.S. 255 Km 46, S. Agostino (FE); I.R.C.A. SERVICE S.p.A, S. S. Cremasca 591, n°10, Fornovo San Giovanni (BG), Italy; Chemark Kft, Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, Hungary; Spachem S.L. Pol. Ind.Guadasequies (VAL), Spain; LUQSA (Lérida Union Quimica/SA) Afores s/n Cp:25173, Sudanel (LLEIDA), Spain

Contenuto netto: 1, 5, 10, 20 Litri

Partita n.

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutti gli indumenti protettivi dopo l'uso.

EUH401: per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

COMRADE è un fungicida per il controllo di ruggini (*Puccinia recondita*, *Puccinia striiformis tritici*) e septoria (*Mycosphaerella graminicola*) su cereali (avena, segale, triticale e frumento) e per il controllo di Cercospora (*Cercospora beticola*) ed oidio (*Erysiphe betae*) su barbabietola da zucchero.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare il prodotto in base alle condizioni riportate in tabella:

Colture	Dose L/ha	Epoca di applicazione	Volume d'acqua L/ha
Cereali (avena, segale, triticale e frumento)	1 L/ha	BBCH 30 - 59	100-400
Barbabietola da zucchero	0.8-1 L/ha	BBCH 31 - 39	200-500

Applicare fino ad un massimo di 2 trattamenti all'anno. Rispettare un intervallo di 18-21 giorni tra un trattamento e quello successivo su barbabietola da zucchero e 21 giorni tra un trattamento e quello successivo su cereali.

Avvertenze: Non rientrare nelle aree trattate prima che il prodotto, depositatosi sulla superficie fogliare, non si sia completamente asciugato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E 42 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CEREALI

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vedersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.