

METASH 3%**Formulato lumachicida granulare a base di metaldeide per uso professionale****COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide purag 3.0

Coformulanti q.b. a.....g 100 *

*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio

CONSIGLI DI PRUDENZA:**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini**P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso**INDICAZIONI SUPPLEMENTARI:****EUH210** Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta**EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso**Titolare della registrazione:****SHARDA Cropchem España S.L.**Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n° 3,
12th Floor, 30006 Murcia, Spagna
Tel. +39 02 3604 2884**Autorizzazione Ministero della Salute n.15969 del 20/04/2018****Stabilimento di Produzione:****LUQSA (Lerida Union Quimica /SA)** Afores s/n - 25173, Sudanel
(LLEIDA), Spagna // **CHEMICAL SMITH C/ Garrotxa N1** 08192
Sant Quirze Vallés, Spagna // **Industrialchimica SRL**, Via Sorgaglia
25, I-35020 Arre (PD), Italia**Taglie:** 100, 200, 250, 500, 750 g; 1, 5, 10, 20, 25 kg**Partita n°****PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Durante la miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare guanti e indumenti protettivi.**INFORMAZIONI MEDICHE:** Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.Lumachicida granulare attivo contro limacce (*Arion* sp., *Deroceras* sp., *Limax* sp.) e chioccioline (*Helix* sp., *Cepaea* sp.).**DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:** Per una migliore efficacia del trattamento applicare in condizioni atmosferiche caratterizzate da clima mite ed umido. In caso di attacchi prolungati, ripetere il trattamento se necessario.

Non applicare prima di piogge abbondanti che possono ridurre la persistenza dei granuli nel terreno.

Applicazioni tardive, specie su piante a foglia larga, possono lasciare traccia dei granuli tra le foglie, prestare particolare attenzione nel caso di piante eduli.

Dose di impiego: 7 Kg/ha da distribuire in modo uniforme sul suolo o sulle colture. Per colture che devono essere interrate il miglior risultato si ottiene applicando il prodotto qualche giorno prima,

diversamente applicarlo dopo che sono state interrate. Su colture già emerse o sviluppate applicare alla comparsa dei sintomi.

Nel caso dei cereali, barbabietola e colza, i granuli possono essere applicate nel solco o sulla superficie del suolo. Non applicare più di 3 volte a stagione (dosaggio massimo di 21 kg/ha). Intervallo minimo tra le applicazioni 7-10 giorni.

Su patata non applicare più di 2 volte a stagione (dosaggio massimo di 14 kg/ha).

Per le dosi e le epoche di impiego fare riferimento alla tabella di seguito.

Coltura	Epoca di impiego
Cereali: frumento, orzo, avena, segale, triticale, sorgo	applicare al momento della semina (solco e/o sulla superficie del terreno) fino allo stadio di accostamento (BBCH 29)
Ortaggi: lattughe, spinaci, rucola, porro, cucurbitacee, solanacee, carote, legumi	applicare sulla superficie del terreno fino allo stadio BBCH 39
Colza	applicare al momento dell'impianto (solco e/o sulla superficie del terreno) fino allo stadio di BBCH 29
Patata	applicare sulla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH 97
Vite	applicare sulla superficie del terreno fino allo stadio BBCH 69
Mais	applicare al momento della semina (solco e/o sulla superficie del terreno) fino allo stadio BBCH 15
Piante ornamentali	applicare sulla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH 99
Pascoli e tappeti erbosi	applicare sulla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH 15 per pascoli, BBCH 99 per tappeti erbosi
Barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio	applicare al momento dell'impianto (solco e/o sulla superficie del terreno) fino allo stadio di 4° foglia (BBCH 15)
Piante da frutto: Melo, pero, pesco, albicocco, nettarina, ciliegio, susino, agrumi (arancio, limone, pompelmo, mandarino), piante da frutto semi-tropicali	applicare quando necessario sulla superficie del terreno fino allo stadio BBCH 69

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo

CONSERVAZIONE: Non conservare a temperature superiori ai 35°C.**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**GESTIONE DELLE RESISTENZE**

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta. Non impiegare a dosi ridotte e alternare ad altri lumachicidi con differente meccanismo d'azione.

METASH 3%

Formulato lumachicida granulare a base di metaldeide per uso professionale

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide purag 3.0
Coformulanti q.b. a.....g 100 *

**contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio*

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Titolare della registrazione:

SHARDA Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n° 3,

12th Floor, 30006 Murcia, Spagna

Tel. +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n.15969 del 20/04/2018

Stabilimento di Produzione:

LUQSA (Lerida Union Quimica /SA) Afores s/n - 25173, Sudanel (LLEIDA), Spagna // **CHEMICAL SMITH C/** Garrotxa N1 08192 Sant Quirze Vallés, Spagna // **Industrialchimica SRL**, Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Italia

Taglie: 100 g

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Durante la miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare guanti e indumenti protettivi.

INFORMAZIONI MEDICHE: Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

METASH 3% PFnPE

Formulato lumachicida granulare a base di metaldeide per uso non professionale ed amatoriale

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide purag 3.0
Coformulanti q.b. a.....g 100 *

*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Titolare della registrazione:

SHARDA Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,
12th Floor, 30006 Murcia, Spagna
Tel. +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n.15969 del 20/04/2018

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

Stabilimento di Produzione:

LUQSA (Lerida Union Quimica /SA) Afores s/n - 25173, Sudanell (LLEIDA), Spagna // **CHEMICAL SMITH C/ Garrotxa N1** 08192 Sant Quirze Vallés, Spagna // **Industrialchimica SRL**, Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Italia

Taglie: 100, 200, 250, 500, 750 g; 1, 5 kg **Partita n°**
.....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Durante la miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare guanti e indumenti protettivi.

INFORMAZIONI MEDICHE: Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Lumachicida granulare attivo contro limacce (*Arion* sp., *Deroceras* sp., *Limax* sp.) e chioccioline (*Helix* sp., *Cepaea* sp.).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO: Per una migliore efficacia del trattamento applicare in condizioni atmosferiche caratterizzate da clima mite ed umido. In caso di attacchi prolungati, ripetere il trattamento se necessario.

Non applicare prima di piogge abbondanti che possono ridurre la persistenza dei granuli nel terreno.

Applicazioni tardive, specie su piante a foglia larga, possono lasciare traccia dei granuli tra le foglie, prestare particolare attenzione nel caso di piante eduli.

Dose di impiego: 7 Kg/ha da distribuire in modo uniforme sul suolo o sulle colture. Per colture che devono essere interrate il miglior risultato si ottiene applicando il prodotto qualche giorno prima,

diversamente applicarlo dopo che sono state interrate. Su colture già emerse o sviluppate applicare alla comparsa dei sintomi.

Nel caso dei cereali i granuli possono essere applicate nel solco o sulla superficie del suolo. Non applicare più di 3 volte a stagione (dosaggio massimo di 21 kg/ha). Intervallo minimo tra le applicazioni 7-10 giorni.

Su patata non applicare più di 2 volte a stagione (dosaggio massimo di 14 kg/ha).

Per le dosi e le epoche di impiego fare riferimento alla tabella di seguito.

Coltura	Epoca di impiego
Cereali: frumento, orzo, avena, segale, triticale, sorgo	applicare al momento della semina (solco e/o sulla superficie del terreno) fino alla fine dell'accostamento
Ortaggi: lattughe, spinaci, rucola, porro, cucurbitacee, solanacee, carote, legumi	applicare sulla superficie del terreno fino alla fine della crescita vegetativa / inizio fruttificazione
Patata	applicare sulla superficie del terreno fino al momento della raccolta
Vite	applicare sulla superficie del terreno fino a fine fioritura
Mais	applicare al momento della semina (solco e/o sulla superficie del terreno) fino alla quinta foglia
Piante ornamentali	applicare sulla superficie del terreno fino a completo sviluppo
Pascoli e tappeti erbosi	applicare sulla superficie del terreno fino a metà dello sviluppo fogliare per pascoli e senza limiti per tappeti erbosi
Piante da frutto: Melo, pero, pesco, albicocco, nettarina, ciliegio, susino, agrumi (arancio, limone, pompelmo, mandarino)	applicare quando necessario sulla superficie del terreno fino a fine fioritura

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo

CONSERVAZIONE: Non conservare a temperature superiori ai 35°C.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta. Non impiegare a dosi ridotte e alternare ad altri lumachicidi con differente meccanismo d'azione.

METASH 3% PF_nPE

Formulato lumachicida granulare a base di metaldeide per uso non professionale ed amatoriale

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide purag 3.0

Coformulanti q.b. a.....g 100 *

**contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio*

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Titolare della registrazione:

SHARDA Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n° 3,

12th Floor, 30006 Murcia, Spagna

Tel. +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n.15969 del 20/04/2018

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

Stabilimento di Produzione:

LUQSA (Lerida Union Quimica /SA) Afores s/n - 25173,Sudanell (LLEIDA), Spagna // **CHEMICAL SMITH C/ Garrotxa N1** 08192 Sant Quirze Vallés, Spagna // **Industrialchimica SRL**, Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Italia

Taglie: 100 g

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Durante la miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare guanti e indumenti protettivi.

INFORMAZIONI MEDICHE: Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE