

METOMOR F™

Fungicida per vite (uve da vino) - Granuli idrodispersibili

Dimetomorf (MoA: H5, FRAC code: 40) - Folpet (MoA: di contatto multisito, FRAC code: M04)

METOMOR F™ - Composizione:

- Dimetomorf puro g 11,3
- Folpet puro g 60
- Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: (H317) Può provocare una reazione allergica cutanea. (H319) Provoca grave irritazione oculare. (H351) Sospettato di provocare il cancro. (H360F) Può nuocere alla fertilità. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (EUH 401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza: (P201) Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. (P261) Evitare di respirare gli aerosol. (P280) Indossare protezione per gli occhi, protezione per il viso, indumenti protettivi, guanti. (P308+P313) IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. (P333+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. (P337+P313) Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. (P362+P364) Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale.

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,
12th Floor 30006 Murcia, Spagna - Tel. +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16027 del 16/05/2017

Stabilimenti di produzione e confezionamento: WEIHAI HANFU BIOCHEMICAL MEDICINE Co., Ltd., Rushanzhai Town, Rushan, Weihai City (Cina) // **INDALVA**, Ap. de correas 160, Carretera de la Matanza, Orihuela, Alicante (Spagna) // **Lerida Union Quimica SA (LUQSA)** Aforse s/n, Sudanel, Lleida (Spagna) // **SPACHEM**, Poligono Industrial, 46839 Guadasséquies, Valencia (Spagna) // **SBM** Formulation Manufacturing Plant, ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers (Francia).

Stabilimenti di confezionamento: **CHEMIA S.p.a.** Via Statale n.327- 44047 Dosso di S. Agostino (Ferrara) // **SCAM S.P.A.** Strada Bellaria n.164, 41126 Modena (MO) // **AGROPAK** Spółka Jawna Brzeziński i wspólnicy 43-603 Jaworzno Darwina Id, Polonia // **Pakon Sp.z o.o.** ul.Zakładowa 7 62-510 Konin Polonia // **AGROTOTAL** Produtos Agroquimicos, S.A. R. Dos Navegantes, No. 48 - R/C Esq. 1200 - 732 Lisboa, Portogallo // **MORAAGRO Kft.** 3937 Komlósk, Rákóczi út 121, Ungheria // **FARMA-CHEM S.A.** Sindos 570 22 P.O. Box – 1026 Thessaloniki, Grecia.

Taglie: 0,5 – 1 – 5 – 10 – 25 kg

Partita n. _____

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata da corpi idrici superficiali di 20 metri. Durante le operazioni di vendemmia, i lavoratori devono indossare occhiali e indumenti adeguati e rispettare un tempo di rientro di 15 giorni. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di malessere contattare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta se possibile.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

METOMOR F è un fungicida in granuli idrodispersibili per la vite efficace contro diversi funghi quali *Peronospora (Plasmopara viticola)* e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).

METOMOR F contiene le sostanze attive folpet e dimetomorf. Il folpet è un fungicida con attività multi-sito di contatto appartenente alla famiglia delle ftalimmidi. Esso agisce inibendo funzioni essenziali, come la germinazione dei conidi degli organismi target. Il dimetomorf è un fungicida CAA (ammidi dell'acido carbossilico) ad attività sistemica attivo contro gli oomiceti che agisce interferendo nella crescita della parete cellulare fungina.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE (uve da vino): 1-1,5 kg/ha, con volumi d'acqua di 400-1000 L/ha, come applicazione preventiva, prima della comparsa dei sintomi, secondo le previsioni della malattia (a partire dalla fase di quinta foglia distesa - BBCH15). I trattamenti vanno distanziati di 10-12 giorni. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.

Modalità di applicazione: Versare la dose prestabilita di prodotto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mescolare accuratamente ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere in agitazione la miscela fino a fine applicazione.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.