

TRIBE 75 WG™

Erbicida di post-emergenza per il diserbo di cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale)

HRAC: B

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Tribenuron metile g 75

Coformulanti: q.b. a g. 100



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

H319 Provoca grave irritazione oculare

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro

P305+P351+P338 **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P391 Raccogliere la fuoriuscita

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali

Titolare della registrazione

Sharda Europe b.v.b.a. Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek Belgium - phone: +39 349 4118246

Autorizzazione Ministero della Salute n° 16028 del 1/9/2015

Stabilimento di produzione: Shandong Vicome Greenland Chemical Co.,Ltd., Diao Town Industrial Park, Zhangqiu, Jinan, Shandong PC 250204, China; Jiangsu Ruidong Pesticides Co., Ltd, No12 Liangchang east road, Jintan, Jiangsu, China; Torre Srl Unipersonale, via Pian D'Asso, 53028, Torrenieri (SI); LUQSA (Lérida Union Quimica/SA) Afores s/n, 25173, Sudanel (Lleida), Spain; Spachem S.L. Pol. Ind.Guadassequies (Valencia), Spain; Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., LTD. No.8,Huacheng East Road, Jintan, Jiangsu, China; Yangzhou Pioneer Chemical Co. Ltd No 45, Xiangyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, China.

Stabilimento di solo confezionamento: AGROPAK Spółka Jawna, Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Poland.

Contenuto netto: 10, 15, 20, 50, 100, 250, 500 g; 1 Kg

Partita n.: vedere contenitore

Prescrizioni supplementari:

Indossare guanti e protezione oculare/facciale durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare i guanti durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non-bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

TRIBE 75 WG è un erbicida di post-emergenza per l'impiego sui cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale), attivo contro infestanti a foglia larga.

TRIBE 75 WG contiene Tribenuron metile, principio attivo ad azione erbicida che viene assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle malerbe con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano da 1 a 4 settimane dall'applicazione.

INFESTANTI CONTROLLATE:

Anagallis foemina (Centocchio), *Anacyclus clavatus* (Camomilla tomentosa), *Brassica nigra* (Senape nera), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium spp.* (Farinello comune), *Descurainia sophia* (Erbasofia), *Diplotaxis spp.* (Rughetta), *Euphorbia exigua* (Euforbia sottile), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine* (Attaccamani), *Hyperico umimberbe* (Cornacchina), *Lactuca serriola* (Lattuga selvatica), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Matricaria spp.* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Oxalis cernua* (Acetosella), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rumex spp.* (Romice), *Shepherdia spp.*, *Stellaria media* (Centocchio comune), *Veronica spp.* (Veronica), *Viola arvensis* (Violetta).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

TRIBE 75 WG è un erbicida di post-emergenza per l'impiego sui cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale), attivo contro infestanti a foglia larga.

Effettuare una applicazione all'anno alla dose di 20 g di formulato ad ettaro (20g/ha).

Effettuare il trattamento quando la coltura si trova nel periodo compreso tra lo stadio di 3 foglie fino allo stadio di foglia a bandiera (BBCH 12-BBCH 39).

Distribuire la dose consigliata con un volume d'acqua pari a 200 -300 litri.

Non applicare prima della fine di febbraio nell'anno di raccolta della coltura trattata.

In caso di necessità di risemina in terreni già trattati, dopo aratura, ricorrere solo a frumento od orzo oppure per colture diverse non seminare o trapiantare prima che siano trascorsi tre mesi dal trattamento con **TRIBE 75 WG**.

Compatibilità: In caso di miscelazione effettuare dei saggi di compatibilità con il prodotto da miscelare.

Avvertenze: Adottare pratiche agronomiche che riducano l'insorgere di fenomeni di resistenza.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre esser osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vedersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

TRIBE 75 WG™

Erbicida di post-emergenza per il diserbo di cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale)

HRAC: B

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Tribenuron metile g 75
Coformulanti: q.b. a g. 100



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P391 Raccogliere la fuoriuscita
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali

Titolare della registrazione

Sharda Europe b.v.b.a. Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek Belgium - phone: +39 349 4118246

Autorizzazione Ministero della Salute n° 16028 del 1/9/2015

Stabilimento di produzione: Shandong Vicome Greenland Chemical Co.,Ltd., Diao Town Industrial Park, Zhangqiu, Jinan, Shandong PC 250204, China; Jiangsu Ruidong Pesticides Co., Ltd, No12 Liangchang east road, Jintan, Jiangsu, China; Torre Srl Unipersonale, via Pian D'Asso, 53028, Torrenieri (SI); LUQSA (Lérida Union Quimica/SA) Afores s/n, 25173, Sudanel (Lleida), Spain; Spachem S.L. Pol. Ind.Guadassequies (Valencia), Spain; Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., LTD. No.8,Huacheng East Road, Jintan, Jiangsu, China; Yangzhou Pioneer Chemical Co. Ltd No 45, Xiangyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, China.

Stabilimento di solo confezionamento: AGROPAK Spółka Jawna, Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Poland.

Contenuto netto: 10, 15, 20, 50, 100 g

Partita n.: vedere contenitore

Prescrizioni supplementari:

Indossare guanti e protezione oculare/facciale durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare i guanti durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non-bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE