

TRIBE 75 WG™

Erbicida di post-emergenza per il diserbo di cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale)

HRAC: B**Composizione:**

100 grammi di prodotto contengono

Tribenuron metile: g 75

Coformulanti: q.b. a g 100

**ATTENZIONE****Indicazioni di Pericolo:**

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

H319 Provoca grave irritazione oculare

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P260 Non respirare la polvere/gli aerosol.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro

P305+P351+P338 **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P391 Raccogliere la fuoriuscita

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.,

Edificio Atalayas business Center, Carril Condomina no. 3, 12th floor, 30006 Murcia, Spagna - Tel 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n° 16028 del 1/9/2015

Stabilimenti di produzione e confezionamento: Shandong Vicome Greenland Chemical Co.,Ltd., Diao Town Industrial Park, Zhangqiu, Jinan, Shandong PC 250204, Cina; Jiangsu Ruidong Pesticides Co., Ltd, No12 Liangchang east road, Jintan, Jiangsu, Cina; Torre Srl Unipersonale, via Pian D'Asso, 53028, Torrenieri (SI); LUQSA (Lérida Union Química/SA) Afores s/n, 25173, Sudanell (Lleida), Spagna; Spachem S.L. Pol. Ind.Guadassequies (Valencia), Spagna; Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., LTD. No.8, Huacheng East Road, Jintan, Jiangsu, Cina; Yangzhou Pioneer Chemical Co. Ltd No 45, Xiangyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, Cina; ZHENJIANG PIONEER CROPSIENCE CO., LTD. No.1 Chuangyezhi Road, Fine Chemical Industrial Park, Gaozi Street, Dantu District Zhenjiang City, Jiangsu Province, Cina; JIANGSU REPONT AGROCHEMICAL CO., LTD NO. 18 Haibin 2 Road, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu 226407 Cina.

Stabilimenti di confezionamento: AGROPAK Spółka Jawna, Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Polonia; FARMA-CHEM S.A. SINDOS 570 22 P.O. BOX – 1026 THESSALONIKI, Grecia; FLOWER S.A. Pol. Ind. la Canaleta, s / n 25300 TÀRREGA (Lleida) Spagna; Pakon Sp.z o.o. ul.Zakładowa 7 62-510 Konin, Polonia.

Contenuto netto: 10, 15, 20, 50, 100, 250, 500 g; 1 Kg

Partita n.: vedere contenitore

Prescrizioni supplementari:

Indossare guanti e protezione oculare/facciale durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare i guanti durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non-bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO**Sintomi:** non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.**Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.**CARATTERISTICHE**

TRIBE 75 WG è un erbicida di post-emergenza per l'impiego sui cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale), attivo contro infestanti a foglia larga.

TRIBE 75 WG contiene Tribenuron metile, principio attivo ad azione erbicida che viene assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle malerbe con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano da 1 a 4 settimane dall'applicazione.

INFESTANTI CONTROLLATE:

Anagallis foemina (Centocchio), *Anacyclus clavatus* (Camomilla tomentosa), *Brassica nigra* (Senape nera), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium spp.* (Farinello comune), *Descurainia sophia* (Erbasofia) *Diploaxis spp.* (Rughetta), *Euphorbia exigua* (Euforbia sottile), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero) *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine* (Attaccamani), *Hyperico umimberbe* (Cornacchina), *Lactuca serriola* (Lattuga selvatica), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Matricaria spp.* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Oxalis cernua* (Acetosella), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rumex spp.* (Romice), *Shepherdia spp.*, *Stellaria media* (Centocchio comune), *Veronica spp.* (Veronica), *Viola arvensis* (Violetta).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

TRIBE 75 WG è un erbicida di post-emergenza per l'impiego sui cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale), attivo contro infestanti a foglia larga.

Effettuare una applicazione all'anno alla dose di 20 g di formulato ad ettaro (20g/ha).

Effettuare il trattamento quando la coltura si trova nel periodo compreso tra lo stadio di 3 foglie fino allo stadio di foglia a bandiera (BBCH 12-BBCH 39).

Distribuire la dose consigliata con un volume d'acqua pari a 200 -300 litri.

Non applicare prima della fine di febbraio nell'anno di raccolta della coltura trattata.

In caso di necessità di risemina in terreni già trattati, dopo aratura, ricorrere solo a frumento od orzo oppure per colture diverse non seminare o trapiantare prima che siano trascorsi tre mesi dal trattamento con **TRIBE 75 WG**.

Compatibilità: In caso di miscelazione effettuare dei saggi di compatibilità con il prodotto da miscelare.

Avvertenze: Adottare pratiche agronomiche che riducano l'insorgere di fenomeni di resistenza.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vedersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

TRIBE 75 WG™

Erbicida di post-emergenza per il diserbo di cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale)

HRAC: B**Composizione:**

100 grammi di prodotto contengono

Tribenuron metile: g 75

Coformulanti: q.b. a g 100

**ATTENZIONE****Indicazioni di Pericolo:**

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

H319 Provoca grave irritazione oculare

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P260 Non respirare la polvere/gli aerosol.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro

P305+P351+P338 **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P391 Raccogliere la fuoriuscita

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.,

Edificio Atalayas business Center, Carril Condomina no. 3, 12th floor, 30006 Murcia, Spagna - Tel 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n° 16028 del 1/9/2015

Stabilimenti di produzione e confezionamento: Shandong Vicome Greenland Chemical Co.,Ltd., Diao Town Industrial Park, Zhangqiu, Jinan, Shandong PC 250204, Cina; Jiangsu Ruidong Pesticides Co., Ltd, No12 Liangchang east road, Jintan, Jiangsu, Cina; Torre Srl Unipersonale, via Pian D'Asso, 53028, Torrenieri (SI); LUQSA (Lérida Union Quimica/SA) Afores s/n, 25173, Sudanell (Lleida), Spagna; Spachem S.L. Pol. Ind.Guadassequies (Valencia), Spagna; Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., LTD. No.8, Huacheng East Road, Jintan, Jiangsu, Cina; Yangzhou Pioneer Chemical Co. Ltd No 45, Xiangyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, Cina; ZHENJIANG PIONEER CROPSIENCE CO., LTD. No.1 Chuangyezhi Road, Fine Chemical Industrial Park, Gaozi Street, Dantu District Zhenjiang City, Jiangsu Province, Cina; JIANGSU REPONT AGROCHEMICAL CO., LTD NO. 18 Haibin 2 Road, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu 226407 Cina.

Stabilimenti di confezionamento: AGROPAK Spółka Jawna, Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Polonia; FARMA-CHEM S.A. SINDOS 570 22 P.O. BOX – 1026 THESSALONIKI, Grecia; FLOWER S.A. Pol. Ind. la Canaleta, s / n 25300 TÀRREGA (Lleida) Spagna; Pakon Sp.z o.o. ul.Zakładowa 7 62-510 Konin, Polonia.

Contenuto netto: 10, 15, 20, 50, 100 g

Partita n.: vedere contenitore

Prescrizioni supplementari:

Indossare guanti e protezione oculare/facciale durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare i guanti durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non-bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO**Sintomi:** non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.**Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE