AZOSHY

Fungicida ad ampio spettro per colture orticole e floreali/ornamentali
Sospensione concentrata
Azoxystrobin – Codice FRAC: 11

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro g 23,2 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene azoxystrobin, methanol

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H332 Nocivo se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 Non disperdere nell'ambiente. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condominia nº 3, 2nd floor – 30006 Murcia, Spagna – Tel. 02 3604 2884

Registrazione Ministero della Salute n. 18991 del 22/06/2026

Stabilimenti di produzione:
SPACHEM S.L. - Pol. Ind. Guadasequies, s/n – 46839 Guadasequies (Valencia), Spain
LUQSA (Lérida Union Quimica/SA) - Afores s/n Cp:25173, Sudanell (LLEIDA), Spain
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. - SS CREMASCA 591 N.10 24040 Fornovo San Giovanni (BG), Italy
Chemia S.p.A. - Via Statale 327 – 44047 Dosso (Ferrara). Italy
Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd. - 1165 Beihai Road, Ningbo, Zheijang Province, China

Contenuto netto : ml 10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 – 800; l 1- 5 -10

Partita n.: vedi corpo della confezione

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 10 metri per le colture orticole (tranne patata).
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini. Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti Azoxystrobin più di una volta ogni due anni per applicazione al suolo su patata.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE
AZOSHY è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine.
Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie delle colture orticole e delle floreali/ornamentali.
AZOSHY è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Malattie	Dosi	Volumi d'acqua l/ha	Numero massimo di applicazioni/ anno
Patata (applicare nei solchi di semina)	Rizoctonia *(Rhizoctonia solani)* Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*	3 l/ha	200-300	1 applicazione ogni due anni

- Non applicare il prodotto per immersione dei tuberi o su patate pregerminate

Colture	Malattie	Dosi l/ha	Volumi d'acqua l/ha	Numero massimo di applicazioni/ anno
Aglio Cipolla Scalogno (solo pieno campo)	Alternaria *(Alternaria porri),* Peronospora *(Peronospora destructor),* Ruggine *(Puccinia allii),*	0.8-1	200-500	3 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie visibili a pre fioritura
Porro (solo pieno campo)	Alternaria *(Alternaria porri), Peronospora (Phytophthor a porri), Ruggine (Puccinia allii),*	0.8-1	200-1000	3 (12-14 giorni di intervallo) da prime foglie visibili a pre fioritura
Carciofo (solo pieno campo)	Peronospora *(Bremia lactucae)* Oidio *(Leveillula taurica)*	0.8-1	500-1250	3 (10-12 giorni di intervallo) dalle prime foglie visibili a pre emergenza del capolino
Asparago (solo pieno campo)	Stemfiliosi *(Stemphylium botryosum),* Ruggine *(Puccinia asparagi)*	0.8-1	300-1000	2 (10-14 giorni di intervallo) da 10% di sviluppo della superficie fogliare

Etichetta autorizzata con DD del 22 giugno 2026

Colture	Malattie	Dosi l/ha	Volumi d'acqua l/ha	Numero massimo di applicazioni/ anno
Carota (solo pieno campo)	Septoria *(Septoria apiicola)* Cercospora *(Cercospora apii, Cercosporiudium punctum)* Alternaria *(Alternaria dauci)* Oidio *(Erysiphe heraclei)*	0.8-1	200-600	3 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino a raccolta
		1	200-600	2 (14 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino a raccolta
		0.8-1	200-600	2 (6-10 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino a raccolta
Sedano (solo pieno campo)		0.8-1	200-600	3 (10-12 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino a raccolta
Cavolfiore Cavoli a testa (solo pieno campo)	Alternaria *(Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola),* Micosferella (*Mycosphaerella brassicicola),*	0.8-1	200-600	2 (12-14 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino a raccolta

Colture	Malattie	Dosi l/ha	Volumi d'acqua l/ha	Numero massimo di applicazioni /anno
Cetriolo, Cocomero (pieno campo e serra)	Cancro gommoso *(Didymella bryoniae)* Oidio *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula cucurbitacearum)* Pseudo-peronospora *(Pseudoperonospora cubensis)*	0,8 -1 pieno campo 0.7-0.8 serra	500-1200	3 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino alla raccolta
Zucchino, Cetriolino, Melone, Zucca (pieno campo e serra)		0.8-1	500-1200	3 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino alla raccolta
Fagiolo e fagiolino (solo pieno campo)	Ruggine *(Uromyces pisi*) Antracnosi *(Ascochyta pisi*, *Ascochyta rabiei, Mycosphaerella pinodes)* Oidio *(Erysiphe pisi)* Peronospora *(Peronospora viciae sp. pisi)*	0.8-1	150-800	2 (14 giorni di intervallo) da prime foglie distese ad inizio sviluppo baccelli per fagiolino, fagiolo e legumi secchi; da pre fioritura e fine fioritura per pisello, taccola e cece
Piselli freschi con e senza baccello **Legumi da granella** (solo pieno campo)			200-500	
Lattughe e insalate *tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf* (solo pieno campo)	Peronospora *(Bremia lactucae),* Oidio *(Erysiphe cichoracearum),*	0.8-1	300-1200	2 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie distese a raccolta

Colture	Malattie	Dosi l/ha	Volumi d'acqua l/ha	Numero massimo di applicazioni/ anno
Erbe fresche (pieno campo e serra)	Peronospora, Septoria *(per prezzemolo)*	0.8-1	300-1200	2 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie distese a raccolta
Pomodoro, Melanzana (pieno campo e serra)	Alternaria *(Alternaria solani)* Cladosporiosi *(Cladosporium spp., Fulvia fulva)* Peronospora *(Phytophthora infestans)* Oidio *(Erysiphe sp., Leveillula taurica)*	0.8-1	400-1200	3 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie distese a raccolta
Peperone (pieno campo e serra)		0.8-1	400-1500	2 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie distese a raccolta
Fragola (pieno campo e serra)	Oidio *(Sphaerotheca macularis),*	0,8-1	600-1000	3 (7-10 giorni di intervallo) da infiorescenze visibili alla raccolta

- Applicare AZOSHY a carattere preventivo.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- Per le applicazioni fare riferimento alla dose ettaro riportata in tabella.
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai.

Etichetta autorizzata con DD del 22 giugno 2026

STRATEGIA ANTIRESISTENZA
Non superare il numero massimo di trattamenti indicati.
Per evitare la selezione di ceppi di funghi resistenti si raccomanda di seguire le linee guida FRAC specifiche per colture e patogeni.

FITOTOSSICITA'
AZOSHY può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con AZOSHY per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

COMPATIBILITA'
In ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Legumi da granella	35 giorni
Porro	21 giorni
Sedano, Fagiolo e Fagiolino, Piselli freschi con e senza baccello, Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Carota, Lattughe e insalate (in serra), Erbe fresche (in serra), Aglio, Cipolla, Scalogno	14 giorni
Carciofo, Lattughe e insalate (in campo), Erbe fresche (in campo), Patata (impiego fogliare)	7 giorni
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Cocomero, Zucchino, Cetriolino, Melone, Zucca, Fragola	3 giorni
Patata (applicazione nei solchi di semina), Asparago	Non necessario

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con DD del 22 giugno 2026

AZOSHY

Fungicida ad ampio spettro per colture orticole e floreali/ornamentali
Sospensione concentrata Azoxystrobin –
Codice FRAC: 11

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro g 23,2 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene azoxystrobin, methanol

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H332 Nocivo se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 Non disperdere nell'ambiente. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Sharda Cropchem España S.L.
Edifico Atalayas Business Center, Carril Condomina nº3, 2nd Floor - 30006 Murcia, Spagna - Tel. 02 3604 2884

Registrazione Ministero della Salute n. 18991 del 22/06/2026

Stabilimenti di produzione:
SPACHEM S.L. - Pol. Ind. Guadasequies, s/n – 46839 Guadasequies (Valencia), Spain
LUQSA (Lérida Union Quimica/SA) - Afores s/n Cp:25173, Sudanell (LLEIDA), Spain
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. - SS CREMASCA 591 N.10 24040 Fornovo San Giovanni (BG), Italy
Chemia S.p.A. - Via Statale 327 – 44047 Dosso (Ferrara). Italy
Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd. - 1165 Beihai Road, Ningbo, Zheijang Province, China

Contenuto netto : ml 10 – 16 – 20 – 25 – 40 – 50 – 100

Partita n.: vedi corpo della confezione

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con DD del 22 giugno 2026